



## Postoperatieve instructies na gebitssanering bij kinderen

### Medicatie

- indien nodig (thuis): Nurofen volgens gewicht

### Extracties

- hechtingsdraadjes verteren vanzelf (enkele dagen tot enkele weken)
- eventueel mondspoeling (Perio-Aid/Corsodyl/Hextril – zonder voorschrift bij apotheek): pas vanaf de dag na de ingreep (gedurende 1 week, 2x/dag) – voor jonge kinderen met behulp van compresjes aan te brengen
- zwemmen: afgeraden gedurende 1 week na de ingreep

### Voeding

- de dag van de ingreep geen warme dranken of warme voeding (dit om geen bloeding te krijgen – ijsjes zijn altijd een goed idee op zo'n dag)
- de dag van de ingreep zachtere en licht verteerbare voeding
- de dag na de ingreep opnieuw gewone voeding

### Mondverzorging

- de dag van de ingreep 's avonds voorzichtig al de tanden poetsen (met hulp van de ouders)
- vanaf de dag nadien 's morgens en 's avonds poetsen (met hulp van de ouders)

### Controle na narcose

- controle na 3 maand bij eigen tandarts

Bij vragen of problemen kan u contact opnemen met de kindertandarts op het nummer 0473/82.00.37 (SMS) of met uw eigen tandarts.

Pieter Van Ingelgem

Kindertandheelkunde

